

**Usa dos rectas numéricas para resolver los problemas.****Respuestas**


- | | | | |
|----|--|---|----------------------------------|
| 1) | En una recaudación de fondos de la escuela, por cada 6 cajas de chocolate vendidas, ganas 4 puntos. Si vendieras 42 cajas, ¿cuántos puntos habrías ganado? | cajas
←————→
puntos
←————→ | 1. _____
2. _____
3. _____ |
| 2) | Por cada 9 latas que Humberto recolectaba para reciclar, ganaba 2 centavos. Después de recolectar 18 latas, ¿cuánto dinero habría ganado? | latas
←————→
dinero
←————→ | 4. _____
5. _____
6. _____ |
| 3) | Una tienda tenía una oferta en la que se podían comprar 2 bolsas de anacardos por \$ 3. Si quisieras comprar 8 bolsas, ¿cuánto costaría? | anacardos
←————→
precio
←————→ | 7. _____
8. _____ |
| 4) | Un cine puso 4 tazas de aceite por cada 8 lotes de palomitas de maíz que hacían. Después de haber hecho 40 lotes de palomitas de maíz, ¿cuánto aceite habrían usado? | palomitas
←————→
aceite
←————→ | |
| 5) | En un videojuego, por cada 8 enemigos derrotados, ganaste 9 puntos. Si derrotaste a 56 enemigos, ¿cuántos puntos habrías ganado? | enemigos
←————→
puntos
←————→ | |
| 6) | La proporción de niños y niñas en el parque fue de 6 a 2. Si había 60 varones, ¿cuántas niñas habrían? | niños
←————→
niñas
←————→ | |
| 7) | Una caja de caramelos tenía 2 trozos de cereza por cada 6 trozos de limón. Si la caja tuviera 36 trozos de limón, ¿cuántos trozos de cereza habría? | limón
←————→
cereza
←————→ | |
| 8) | Un constructor podría obtener 2 láminas de yeso por \$9. Si hubiera comprado 20 láminas, ¿cuánto dinero habría gastado? | láminas de yeso
←————→
precio
←————→ | |




Usa dos rectas numéricas para resolver los problemas.

Respuestas


- 1) En una recaudación de fondos de la escuela, por cada 6 cajas de chocolate vendidas, ganas 4 puntos. Si vendieras 42 cajas, ¿cuántos puntos habrías ganado?

1. **28**


- 2) Por cada 9 latas que Humberto recolectaba para reciclar, ganaba 2 centavos. Después de recolectar 18 latas, ¿cuánto dinero habría ganado?

2. **4**3. **12**4. **20**5. **63**


- 3) Una tienda tenía una oferta en la que se podían comprar 2 bolsas de anacardos por \$ 3. Si quisieras comprar 8 bolsas, ¿cuánto costaría?

6. **20**7. **12**


- 4) Un cine puso 4 tazas de aceite por cada 8 lotes de palomitas de maíz que hacían. Después de haber hecho 40 lotes de palomitas de maíz, ¿cuánto aceite habrían usado?

8. **90**


- 5) En un videojuego, por cada 8 enemigos derrotados, ganaste 9 puntos. Si derrotaste a 56 enemigos, ¿cuántos puntos habrías ganado?




- 6) La proporción de niños y niñas en el parque fue de 6 a 2. Si había 60 varones, ¿cuántas niñas habrían?



- 7) Una caja de caramelos tenía 2 trozos de cereza por cada 6 trozos de limón. Si la caja tuviera 36 trozos de limón, ¿cuántos trozos de cereza habrían?



- 8) Un constructor podría obtener 2 láminas de yeso por \$9. Si hubiera comprado 20 láminas, ¿cuánto dinero habría gastado?



**Usa dos rectas numéricas para resolver los problemas.****Respuestas**


- | | | | |
|----|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1) | Un cine puso 2 tazas de aceite por cada 3 lotes de palomitas de maíz que hacían. Después de haber hecho 18 lotes de palomitas de maíz, ¿cuánto aceite habrían usado? | palomitas
↔
↔
aceite | 1. _____
2. _____ |
| 2) | Un constructor podría obtener 8 láminas de yeso por \$4. Si hubiera comprado 40 láminas, ¿cuánto dinero habría gastado? | láminas de yeso
↔
↔
precio | 3. _____
4. _____
5. _____ |
| 3) | Una tienda tenía una oferta en la que se podían comprar 8 bolsas de anacardos por \$4. Si quisieras comprar 64 bolsas, ¿cuánto costaría? | anacardos
↔
↔
precio | 6. _____
7. _____ |
| 4) | La proporción de niños y niñas en el parque fue de 4 a 8. Si había 36 varones, ¿cuántas niñas habrían? | niños
↔
↔
niñas | 8. _____ |
| 5) | Una receta requiere 10 cucharaditas de condimento por cada 6 lotes de pollo. Si tienes 12 lotes de pollo, ¿cuántas cucharaditas de condimento necesitará? | pollo
↔
↔
condimento | |
| 6) | Un restaurante de Joe dio 10 servilletas por cada 6 artículos ordenados. Si alguien compró 24 artículos, ¿cuántas servilletas debería obtener? | artículo
↔
↔
servilletas | |
| 7) | En una recaudación de fondos de la escuela, por cada 6 cajas de chocolate vendidas, ganas 8 puntos. Si vendieras 12 cajas, ¿cuántos puntos habrías ganado? | cajas
↔
↔
puntos | |
| 8) | Una caja de caramelos tenía 4 trozos de cereza por cada 10 trozos de limón. Si la caja tuviera 20 trozos de limón, ¿cuántos trozos de cereza habría? | limón
↔
↔
cereza | |




Usa dos rectas numéricas para resolver los problemas.

Respuestas


- 1) Un cine puso 2 tazas de aceite por cada 3 lotes de palomitas de maíz que hacían. Después de haber hecho 18 lotes de palomitas de maíz, ¿cuánto aceite habrían usado?

1. **12**


- 2) Un constructor podría obtener 8 láminas de yeso por \$4. Si hubiera comprado 40 láminas, ¿cuánto dinero habría gastado?

2. **20**


- 3) Una tienda tenía una oferta en la que se podían comprar 8 bolsas de anacardos por \$4. Si quisieras comprar 64 bolsas, ¿cuánto costaría?

3. **32**4. **72**5. **20**


- 4) La proporción de niños y niñas en el parque fue de 4 a 8. Si había 36 varones, ¿cuántas niñas habrían?

6. **40**7. **16**8. **8**


- 5) Una receta requiere 10 cucharaditas de condimento por cada 6 lotes de pollo. Si tienes 12 lotes de pollo, ¿cuántas cucharaditas de condimento necesitará?




- 6) Un restaurante de Joe dio 10 servilletas por cada 6 artículos ordenados. Si alguien compró 24 artículos, ¿cuántas servilletas debería obtener?



- 7) En una recaudación de fondos de la escuela, por cada 6 cajas de chocolate vendidas, ganas 8 puntos. Si vendieras 12 cajas, ¿cuántos puntos habrías ganado?



- 8) Una caja de caramelos tenía 4 trozos de cereza por cada 10 trozos de limón. Si la caja tuviera 20 trozos de limón, ¿cuántos trozos de cereza habría?




**Usa dos rectas numéricas para resolver los problemas.****Respuestas**


- 1) ¿cuánto dinero habría gastado?

Un constructor podría obtener 6 láminas de yeso por \$4. Si hubiera comprado 42 láminas, ¿cuánto dinero habría gastado?

láminas de yeso



precio




1. _____

2. _____


- 2) ¿cuántas servilletas debería obtener?

Un restaurante de Joe dio 3 servilletas por cada 6 artículos ordenados. Si alguien compró 42 artículos, ¿cuántas servilletas debería obtener?

artículos



servilletas



3. _____


4. _____

5. _____


- 3) ¿cuántas canciones country tiene?

En su reproductor MP3, por cada 6 canciones de pop que Julieta tenía, también tenía 3 canción(es) de country. Si tiene 18 canciones pop en su reproductor MP3, ¿cuántas canciones country tiene?

canciones de pop



canciones country



6. _____

7. _____


- 4) ¿cuántas cucharaditas de condimento necesitará?

Una receta requiere 4 cucharaditas de condimento por cada 10 lotes de pollo. Si tienes 80 lotes de pollo, ¿cuántas cucharaditas de condimento necesitará?

lotes de pollo



cucharaditas de condimento




8. _____


- 5) ¿cuántos trozos de cereza habría?

Una caja de caramelos tenía 3 trozos de cereza por cada 6 trozos de limón. Si la caja tuviera 18 trozos de limón, ¿cuántos trozos de cereza habría?

trozos de limón




trozos de cereza




- 6) ¿cuánto costaría?

Una tienda tenía una oferta en la que se podían comprar 8 bolsas de anacardos por \$9. Si quisieras comprar 40 bolsas, ¿cuánto costaría?

bolsas de anacardos




precio




- 7) ¿cuántas niñas habrían?

La proporción de niños y niñas en el parque fue de 4 a 7. Si había 24 varones, ¿cuántas niñas habrían?

niños




niñas




- 8) ¿cuántos puntos habrías ganado?

En una recaudación de fondos de la escuela, por cada 6 cajas de chocolate vendidas, ganas 9 puntos. Si vendieras 60 cajas, ¿cuántos puntos habrías ganado?

cajas de chocolate



puntos






Usa dos rectas numéricas para resolver los problemas.

Respuestas


1)

Un constructor podría obtener 6 láminas de yeso por \$4. Si hubiera comprado 42 láminas, ¿cuánto dinero habría gastado?

1. **28**


2)

Un restaurante de Joe dio 3 servilletas por cada 6 artículos ordenados. Si alguien compró 42 artículos, ¿cuántas servilletas debería obtener?

2. **21**3. **9**4. **32**5. **9**


3)

En su reproductor MP3, por cada 6 canciones de pop que Julieta tenía, también tenía 3 canción(es) de country. Si tiene 18 canciones pop en su reproductor MP3, ¿cuántas canciones country tiene?

6. **45**7. **42**


4)

Una receta requiere 4 cucharaditas de condimento por cada 10 lotes de pollo. Si tienes 80 lotes de pollo, ¿cuántas cucharaditas de condimento necesitará?

8. **90**


5)

Una caja de caramelos tenía 3 trozos de cereza por cada 6 trozos de limón. Si la caja tuviera 18 trozos de limón, ¿cuántos trozos de cereza habría?




6)

Una tienda tenía una oferta en la que se podían comprar 8 bolsas de anacardos por \$9. Si quisieras comprar 40 bolsas, ¿cuánto costaría?




7)

La proporción de niños y niñas en el parque fue de 4 a 7. Si había 24 varones, ¿cuántas niñas habían?



8)

En una recaudación de fondos de la escuela, por cada 6 cajas de chocolate vendidas, ganas 9 puntos. Si vendieras 60 cajas, ¿cuántos puntos habrías ganado?



**Usa dos rectas numéricas para resolver los problemas.****Respuestas**


- | | | |
|---|---|----------------------------------|
| 1) Por cada 10 latas que Marco recolectaba para reciclar, ganaba 2 centavos. Después de recolectar 70 latas, ¿cuánto dinero habría ganado? | latas
←————→
dinero
←————→ | 1. _____
2. _____ |
| 2) La proporción de niños y niñas en el parque fue de 6 a 4. Si había 30 varones, ¿cuántas niñas habían? | niños
←————→
niñas
←————→ | 3. _____
4. _____
5. _____ |
| 3) En un videojuego, por cada 7 enemigos derrotados, ganaste 2 puntos. Si derrotaste a 56 enemigos, ¿cuántos puntos habrías ganado? | enemigos
←————→
puntos
←————→ | 6. _____
7. _____ |
| 4) Una caja de caramelos tenía 8 trozos de cereza por cada 10 trozos de limón. Si la caja tuviera 20 trozos de limón, ¿cuántos trozos de cereza habría? | limón
←————→
cereza
←————→ | 8. _____ |
| 5) Un constructor podría obtener 7 láminas de yeso por \$5. Si hubiera comprado 42 láminas, ¿cuánto dinero habría gastado? | láminas de yeso
←————→
precio
←————→ | |
| 6) Una receta requiere 8 cucharaditas de condimento por cada 3 lotes de pollo. Si tienes 15 lotes de pollo, ¿cuántas cucharaditas de condimento necesitará? | pollo
←————→
condimento
←————→ | |
| 7) Un cine puso 5 tazas de aceite por cada 6 lotes de palomitas de maíz que hacían. Después de haber hecho 12 lotes de palomitas de maíz, ¿cuánto aceite habrían usado? | palomitas
←————→
aceite
←————→ | |
| 8) Un restaurante de Joe dio 5 servilletas por cada 7 artículos ordenados. Si alguien compró 70 artículos, ¿cuántas servilletas debería obtener? | artículo
←————→
servilletas
←————→ | |




Usa dos rectas numéricas para resolver los problemas.

Respuestas


- 1) Por cada 10 latas que Marco recolectaba para reciclar, ganaba 2 centavos. Después de recolectar 70 latas, ¿cuánto dinero habría ganado?

1. **14**


- 2) La proporción de niños y niñas en el parque fue de 6 a 4. Si había 30 varones, ¿cuántas niñas habían?

2. **20**3. **16**


- 3) En un videojuego, por cada 7 enemigos derrotados, ganaste 2 puntos. Si derrotaste a 56 enemigos, ¿cuántos puntos habrías ganado?

4. **16**5. **30**


- 4) Una caja de caramelos tenía 8 trozos de cereza por cada 10 trozos de limón. Si la caja tuviera 20 trozos de limón, ¿cuántos trozos de cereza habría?

6. **40**7. **10**8. **50**


- 5) Un constructor podría obtener 7 láminas de yeso por \$5. Si hubiera comprado 42 láminas, ¿cuánto dinero habría gastado?




- 6) Una receta requiere 8 cucharaditas de condimento por cada 3 lotes de pollo. Si tienes 15 lotes de pollo, ¿cuántas cucharaditas de condimento necesitará?



- 7) Un cine puso 5 tazas de aceite por cada 6 lotes de palomitas de maíz que hacían. Después de haber hecho 12 lotes de palomitas de maíz, ¿cuánto aceite habrían usado?



- 8) Un restaurante de Joe dio 5 servilletas por cada 7 artículos ordenados. Si alguien compró 70 artículos, ¿cuántas servilletas debería obtener?



**Usa dos rectas numéricas para resolver los problemas.****Respuestas**


- | | | | |
|----|---|---|----------------------------------|
| 1) | Una caja de caramelos tenía 10 trozos de cereza por cada 6 trozos de limón. Si la caja tuviera 24 trozos de limón , ¿cuántos trozos de cereza habría? | limón
←————→
cereza
←————→ | 1. _____
2. _____ |
| 2) | En una recaudación de fondos de la escuela, por cada 3 cajas de chocolate vendidas, ganas 8 puntos. Si vendieras 21 cajas , ¿cuántos puntos habrías ganado? | cajas
←————→
puntos
←————→ | 3. _____
4. _____
5. _____ |
| 3) | Por cada 5 latas que Humberto recolectaba para reciclar, ganaba 4 centavos. Después de recolectar 30 latas, ¿cuánto dinero habría ganado? | latas
←————→
dinero
←————→ | 6. _____
7. _____ |
| 4) | Un restaurante de Joe dio 5 servilletas por cada 6 artículos ordenados. Si alguien compró 12 artículos, ¿cuántas servilletas debería obtener? | artículo
←————→
servilletas
←————→ | 8. _____ |
| 5) | Una receta requiere 4 cucharaditas de condimento por cada 8 lotes de pollo. Si tienes 48 lotes de pollo, ¿cuántas cucharaditas de condimento necesitará? | pollo
←————→
condimento
←————→ | |
| 6) | En un videojuego, por cada 3 enemigos derrotados, ganaste 5 puntos. Si derrotaste a 6 enemigos, ¿cuántos puntos habrías ganado? | enemigos
←————→
puntos
←————→ | |
| 7) | Una tienda tenía una oferta en la que se podían comprar 9 bolsas de anacardos por \$ 6. Si quisieras comprar 18 bolsas, ¿cuánto costaría? | anacardos
←————→
precio
←————→ | |
| 8) | La proporción de niños y niñas en el parque fue de 4 a 9. Si había 28 varones, ¿cuántas niñas habrían? | niños
←————→
niñas
←————→ | |




Usa dos rectas numéricas para resolver los problemas.

Respuestas


- 1) Una caja de caramelos tenía 10 trozos de cereza por cada 6 trozos de limón. Si la caja tuviera 24 trozos de limón, ¿cuántos trozos de cereza habría?

1. **40**


- 2) En una recaudación de fondos de la escuela, por cada 3 cajas de chocolate vendidas, ganas 8 puntos. Si vendieras 21 cajas, ¿cuántos puntos habrías ganado?

2. **56**


- 3) Por cada 5 latas que Humberto recolectaba para reciclar, ganaba 4 centavos. Después de recolectar 30 latas, ¿cuánto dinero habría ganado?

3. **24**


- 4) Un restaurante de Joe dio 5 servilletas por cada 6 artículos ordenados. Si alguien compró 12 artículos, ¿cuántas servilletas debería obtener?

4. **10**


- 5) Una receta requiere 4 cucharaditas de condimento por cada 8 lotes de pollo. Si tienes 48 lotes de pollo, ¿cuántas cucharaditas de condimento necesitará?

5. **24**


- 6) En un videojuego, por cada 3 enemigos derrotados, ganaste 5 puntos. Si derrotaste a 6 enemigos, ¿cuántos puntos habrías ganado?

6. **10**

- 7) Una tienda tenía una oferta en la que se podían comprar 9 bolsas de anacardos por \$ 6. Si quisieras comprar 18 bolsas, ¿cuánto costaría?

7. **12**

- 8) La proporción de niños y niñas en el parque fue de 4 a 9. Si había 28 varones, ¿cuántas niñas habrían?

8. **63**

**Usa dos rectas numéricas para resolver los problemas.****Respuestas**


- | | | | |
|----|--|---|----------------------------------|
| 1) | Una caja de caramelos tenía 8 trozos de cereza por cada 9 trozos de limón. Si la caja tuviera 72 trozos de limón, ¿cuántos trozos de cereza habría? | limón
←————→
cereza
←————→ | 1. _____
2. _____ |
| 2) | Un constructor podría obtener 9 láminas de yeso por \$5. Si hubiera comprado 90 láminas, ¿cuánto dinero habría gastado? | de yeso
←————→
precio
←————→ | 3. _____
4. _____
5. _____ |
| 3) | Una receta requiere 8 cucharaditas de condimento por cada 5 lotes de pollo. Si tienes 10 lotes de pollo, ¿cuántas cucharaditas de condimento necesitará? | pollo
←————→
condimento
←————→ | 6. _____
7. _____ |
| 4) | Por cada 7 latas que Humberto recolectaba para reciclar, ganaba 9 centavos. Después de recolectar 14 latas, ¿cuánto dinero habría ganado? | latas
←————→
dinero
←————→ | 8. _____ |
| 5) | En un videojuego, por cada 3 enemigos derrotados, ganaste 6 puntos. Si derrotaste a 24 enemigos, ¿cuántos puntos habrías ganado? | enemigos
←————→
puntos
←————→ | |
| 6) | La proporción de niños y niñas en el parque fue de 9 a 5. Si había 18 varones, ¿cuántas niñas habían? | niños
←————→
niñas
←————→ | |
| 7) | En su reproductor MP3, por cada 7 canciones de pop que Karen tenía, también tenía 8 canción(es) de country. Si tiene 49 canciones pop en su reproductor MP3, ¿cuántas canciones country tiene? | musica pop
←————→
country
←————→ | |
| 8) | Un restaurante de Joe dio 8 servilletas por cada 9 artículos ordenados. Si alguien compró 90 artículos, ¿cuántas servilletas debería obtener? | artículo
←————→
servilletas
←————→ | |




Usa dos rectas numéricas para resolver los problemas.

Respuestas


- 1) Una caja de caramelos tenía 8 trozos de cereza por cada 9 trozos de limón. Si la caja tuviera 72 trozos de limón, ¿cuántos trozos de cereza habría?

1. **64**


- 2) Un constructor podría obtener 9 láminas de yeso por \$5. Si hubiera comprado 90 láminas, ¿cuánto dinero habría gastado?

2. **50**3. **16**4. **18**5. **48**


- 3) Una receta requiere 8 cucharaditas de condimento por cada 5 lotes de pollo. Si tienes 10 lotes de pollo, ¿cuántas cucharaditas de condimento necesitará?

6. **10**7. **56**


- 4) Por cada 7 latas que Humberto recolectaba para reciclar, ganaba 9 centavos. Después de recolectar 14 latas, ¿cuánto dinero habría ganado?

8. **80**


- 5) En un videojuego, por cada 3 enemigos derrotados, ganaste 6 puntos. Si derrotaste a 24 enemigos, ¿cuántos puntos habrías ganado?




- 6) La proporción de niños y niñas en el parque fue de 9 a 5. Si había 18 varones, ¿cuántas niñas habían?



- 7) En su reproductor MP3, por cada 7 canciones de pop que Karen tenía, también tenía 8 canción(es) de country. Si tiene 49 canciones pop en su reproductor MP3, ¿cuántas canciones country tiene?



- 8) Un restaurante de Joe dio 8 servilletas por cada 9 artículos ordenados. Si alguien compró 90 artículos, ¿cuántas servilletas debería obtener?



**Usa dos rectas numéricas para resolver los problemas.****Respuestas**


- | | | | |
|----|---|---|----------------------------------|
| 1) | Un restaurante de Joe dio 6 servilletas por cada 4 artículos ordenados. Si alguien compró 16 artículos, ¿cuántas servilletas debería obtener? | artículos
←————→
servilletas
←————→ | 1. _____
2. _____ |
| 2) | Por cada 9 latas que Quique recolectaba para reciclar, ganaba 4 centavos. Después de recolectar 72 latas, ¿cuánto dinero habría ganado? | latas
←————→
dinero
←————→ | 3. _____
4. _____
5. _____ |
| 3) | En una recaudación de fondos de la escuela, por cada 6 cajas de chocolate vendidas, ganas 10 puntos. Si vendieras 12 cajas, ¿cuántos puntos habrías ganado? | cajas
←————→
puntos
←————→ | 6. _____
7. _____ |
| 4) | Una tienda tenía una oferta en la que se podían comprar 7 bolsas de anacardos por \$ 8. Si quisieras comprar 56 bolsas, ¿cuánto costaría? | anacardos
←————→
precio
←————→ | 8. _____ |
| 5) | Una receta requiere 4 cucharaditas de condimento por cada 3 lotes de pollo. Si tienes 6 lotes de pollo, ¿cuántas cucharaditas de condimento necesitará? | pollo
←————→
condimento
←————→ | |
| 6) | En un videojuego, por cada 5 enemigos derrotados, ganaste 4 puntos. Si derrotaste a 50 enemigos, ¿cuántos puntos habrías ganado? | enemigos
←————→
puntos
←————→ | |
| 7) | Un cine puso 7 tazas de aceite por cada 10 lotes de palomitas de maíz que hacían. Después de haber hecho 70 lotes de palomitas de maíz, ¿cuánto aceite habrían usado? | palomitas
←————→
aceite
←————→ | |
| 8) | Un constructor podría obtener 3 láminas de yeso por \$2. Si hubiera comprado 27 láminas, ¿cuánto dinero habría gastado? | láminas de yeso
←————→
precio
←————→ | |




Usa dos rectas numéricas para resolver los problemas.

Respuestas


- 1) Un restaurante de Joe dio 6 servilletas por cada 4 artículos ordenados. Si alguien compró 16 artículos, ¿cuántas servilletas debería obtener?

1. **24**


- 2) Por cada 9 latas que Quique recolectaba para reciclar, ganaba 4 centavos. Después de recolectar 72 latas, ¿cuánto dinero habría ganado?

2. **32**3. **20**4. **64**5. **8**


- 3) En una recaudación de fondos de la escuela, por cada 6 cajas de chocolate vendidas, ganas 10 puntos. Si vendieras 12 cajas, ¿cuántos puntos habrías ganado?

6. **40**7. **49**


- 4) Una tienda tenía una oferta en la que se podían comprar 7 bolsas de anacardos por \$ 8. Si quisieras comprar 56 bolsas, ¿cuánto costaría?

8. **18**


- 5) Una receta requiere 4 cucharaditas de condimento por cada 3 lotes de pollo. Si tienes 6 lotes de pollo, ¿cuántas cucharaditas de condimento necesitará?




- 6) En un videojuego, por cada 5 enemigos derrotados, ganaste 4 puntos. Si derrotaste a 50 enemigos, ¿cuántos puntos habrías ganado?



- 7) Un cine puso 7 tazas de aceite por cada 10 lotes de palomitas de maíz que hacían. Después de haber hecho 70 lotes de palomitas de maíz, ¿cuánto aceite habrían usado?



- 8) Un constructor podría obtener 3 láminas de yeso por \$2. Si hubiera comprado 27 láminas, ¿cuánto dinero habría gastado?



**Usa dos rectas numéricas para resolver los problemas.****Respuestas**


- | | | | |
|----|---|---|----------------------------------|
| 1) | Una receta requiere 7 cucharaditas de condimento por cada 8 lotes de pollo. Si tienes 40 lotes de pollo, ¿cuántas cucharaditas de condimento necesitará? | pollo
←————→
condimento
←————→ | 1. _____
2. _____ |
| 2) | En un videojuego, por cada 6 enemigos derrotados, ganaste 8 puntos. Si derrotaste a 24 enemigos, ¿cuántos puntos habrías ganado? | enemigos
←————→
puntos
←————→ | 3. _____
4. _____
5. _____ |
| 3) | Una tienda tenía una oferta en la que se podían comprar 8 bolsas de anacardos por \$ 3. Si quisieras comprar 56 bolsas, ¿cuánto costaría? | anacardos
←————→
precio
←————→ | 6. _____
7. _____ |
| 4) | Un restaurante de Joe dio 3 servilletas por cada 10 artículos ordenados. Si alguien compró 50 artículos, ¿cuántas servilletas debería obtener? | artículo
←————→
servilletas
←————→ | 8. _____ |
| 5) | Por cada 4 latas que Paulo recolectaba para reciclar, ganaba 5 centavos. Después de recolectar 16 latas, ¿cuánto dinero habría ganado? | latas
←————→
dinero
←————→ | |
| 6) | Un constructor podría obtener 9 láminas de yeso por \$8. Si hubiera comprado 81 láminas, ¿cuánto dinero habría gastado? | láminas de yeso
←————→
precio
←————→ | |
| 7) | Una caja de caramelos tenía 8 trozos de cereza por cada 9 trozos de limón. Si la caja tuviera 90 trozos de limón, ¿cuántos trozos de cereza habría? | limón
←————→
cereza
←————→ | |
| 8) | En su reproductor MP3, por cada 10 canciones de pop que Laura tenía, también tenía 2 canción(es) de country. Si tiene 80 canciones pop en su reproductor MP3, ¿cuántas canciones country tiene? | canciones de pop
←————→
country
←————→ | |




Usa dos rectas numéricas para resolver los problemas.

Respuestas


- 1) Una receta requiere 7 cucharaditas de condimento por cada 8 lotes de pollo. Si tienes 40 lotes de pollo, ¿cuántas cucharaditas de condimento necesitará?

1. **35**


- 2) En un videojuego, por cada 6 enemigos derrotados, ganaste 8 puntos. Si derrotaste a 24 enemigos, ¿cuántos puntos habrías ganado?

2. **32**3. **21**4. **15**5. **20**


- 3) Una tienda tenía una oferta en la que se podían comprar 8 bolsas de anacardos por \$ 3. Si quisieras comprar 56 bolsas, ¿cuánto costaría?

6. **72**7. **80**


- 4) Un restaurante de Joe dio 3 servilletas por cada 10 artículos ordenados. Si alguien compró 50 artículos, ¿cuántas servilletas debería obtener?

8. **16**


- 5) Por cada 4 latas que Paulo recolectaba para reciclar, ganaba 5 centavos. Después de recolectar 16 latas, ¿cuánto dinero habría ganado?




- 6) Un constructor podría obtener 9 láminas de yeso por \$8. Si hubiera comprado 81 láminas, ¿cuánto dinero habría gastado?



- 7) Una caja de caramelos tenía 8 trozos de cereza por cada 9 trozos de limón. Si la caja tuviera 90 trozos de limón, ¿cuántos trozos de cereza habría?



- 8) En su reproductor MP3, por cada 10 canciones de pop que Laura tenía, también tenía 2 canción(es) de country. Si tiene 80 canciones pop en su reproductor MP3, ¿cuántas canciones country tiene?



**Usa dos rectas numéricas para resolver los problemas.****Respuestas**

- | | | |
|---|--|----------------------------------|
| 1) Un constructor podría obtener 2 láminas de yeso por \$5. Si hubiera comprado 14 láminas, ¿cuánto dinero habría gastado? | láminas de yeso
←————→
precio
←————→ | 1. _____
2. _____ |
| 2) Un cine puso 9 tazas de aceite por cada 4 lotes de palomitas de maíz que hacían. Después de haber hecho 36 lotes de palomitas de maíz, ¿cuánto aceite habrían usado? | palomitas
←————→
aceite
←————→ | 3. _____
4. _____
5. _____ |
| 3) En su reproductor MP3, por cada 2 canciones de pop que Karen tenía, también tenía 3 canción(es) de country. Si tiene 14 canciones pop en su reproductor MP3, ¿cuántas canciones country tiene? | canciones de pop
←————→
canciones de country
←————→ | 6. _____
7. _____ |
| 4) Un restaurante de Joe dio 3 servilletas por cada 7 artículos ordenados. Si alguien compró 63 artículos, ¿cuántas servilletas debería obtener? | artículos
←————→
servilletas
←————→ | 8. _____ |
| 5) En un videojuego, por cada 2 enemigos derrotados, ganaste 3 puntos. Si derrotaste a 8 enemigos, ¿cuántos puntos habrías ganado? | enemigos
←————→
puntos
←————→ | |
| 6) Una caja de caramelos tenía 9 trozos de cereza por cada 6 trozos de limón. Si la caja tuviera 60 trozos de limón, ¿cuántos trozos de cereza habría? | limón
←————→
cerezas
←————→ | |
| 7) Una receta requiere 9 cucharaditas de condimento por cada 5 lotes de pollo. Si tienes 45 lotes de pollo, ¿cuántas cucharaditas de condimento necesitará? | pollo
←————→
condimento
←————→ | |
| 8) Por cada 2 latas que Daniel recolectaba para reciclar, ganaba 5 centavos. Después de recolectar 20 latas, ¿cuánto dinero habría ganado? | latas
←————→
dinero
←————→ | |




Usa dos rectas numéricas para resolver los problemas.

Respuestas


1)

Un constructor podría obtener 2 láminas de yeso por \$5. Si hubiera comprado 14 láminas, ¿cuánto dinero habría gastado?

1. **35**


2)

Un cine puso 9 tazas de aceite por cada 4 lotes de palomitas de maíz que hacían. Después de haber hecho 36 lotes de palomitas de maíz, ¿cuánto aceite habrían usado?

2. **81**


3)

En su reproductor MP3, por cada 2 canciones de pop que Karen tenía, también tenía 3 canción(es) de country. Si tiene 14 canciones pop en su reproductor MP3, ¿cuántas canciones country tiene?

3. **21**4. **27**5. **12**6. **90**7. **81**8. **50**


4)

Un restaurante de Joe dio 3 servilletas por cada 7 artículos ordenados. Si alguien compró 63 artículos, ¿cuántas servilletas debería obtener?




5)

En un videojuego, por cada 2 enemigos derrotados, ganaste 3 puntos. Si derrotaste a 8 enemigos, ¿cuántos puntos habrías ganado?




6)

Una caja de caramelos tenía 9 trozos de cereza por cada 6 trozos de limón. Si la caja tuviera 60 trozos de limón, ¿cuántos trozos de cereza habría?




7)

Una receta requiere 9 cucharaditas de condimento por cada 5 lotes de pollo. Si tienes 45 lotes de pollo, ¿cuántas cucharaditas de condimento necesitará?




8)

Por cada 2 latas que Daniel recolectaba para reciclar, ganaba 5 centavos. Después de recolectar 20 latas, ¿cuánto dinero habría ganado?



**Usa dos rectas numéricas para resolver los problemas.****Respuestas**


- 1) En su reproductor MP3, por cada 5 canciones de pop que Flor tenía, también tenía 6 canción(es) de country. Si tiene 40 canciones pop en su reproductor MP3, ¿cuántas canciones country tiene?



1. _____

2. _____

- 2) Por cada 2 latas que Leonardo recolectaba para reciclar, ganaba 7 centavos. Después de recolectar 10 latas, ¿cuánto dinero habría ganado?




3. _____

4. _____

5. _____


- 3) Un cine puso 3 tazas de aceite por cada 7 lotes de palomitas de maíz que hacían. Después de haber hecho 14 lotes de palomitas de maíz, ¿cuánto aceite habrían usado?



6. _____


7. _____

- 4) La proporción de niños y niñas en el parque fue de 6 a 7. Si había 24 varones, ¿cuántas niñas habrían?




8. _____


- 5) Una receta requiere 10 cucharaditas de condimento por cada 5 lotes de pollo. Si tienes 50 lotes de pollo, ¿cuántas cucharaditas de condimento necesitará?




- 6) Un constructor podría obtener 4 láminas de yeso por \$2. Si hubiera comprado 12 láminas, ¿cuánto dinero habría gastado?



- 7) Una caja de caramelos tenía 7 trozos de cereza por cada 8 trozos de limón. Si la caja tuviera 72 trozos de limón, ¿cuántos trozos de cereza habría?




- 8) Una tienda tenía una oferta en la que se podían comprar 9 bolsas de anacardos por \$ 10. Si quisieras comprar 27 bolsas, ¿cuánto costaría?






Usa dos rectas numéricas para resolver los problemas.


- 1) En su reproductor MP3, por cada 5 canciones de pop que Flor tenía, también tenía 6 canción(es) de country. Si tiene 40 canciones pop en su reproductor MP3, ¿cuántas canciones country tiene?




- 2) Por cada 2 latas que Leonardo recolectaba para reciclar, ganaba 7 centavos. Después de recolectar 10 latas, ¿cuánto dinero habría ganado?




- 3) Un cine puso 3 tazas de aceite por cada 7 lotes de palomitas de maíz que hacían. Después de haber hecho 14 lotes de palomitas de maíz, ¿cuánto aceite habrían usado?




- 4) La proporción de niños y niñas en el parque fue de 6 a 7. Si había 24 varones, ¿cuántas niñas habrían?




- 5) Una receta requiere 10 cucharaditas de condimento por cada 5 lotes de pollo. Si tienes 50 lotes de pollo, ¿cuántas cucharaditas de condimento necesitará?




- 6) Un constructor podría obtener 4 láminas de yeso por \$2. Si hubiera comprado 12 láminas, ¿cuánto dinero habría gastado?



- 7) Una caja de caramelos tenía 7 trozos de cereza por cada 8 trozos de limón. Si la caja tuviera 72 trozos de limón, ¿cuántos trozos de cereza habría?



- 8) Una tienda tenía una oferta en la que se podían comprar 9 bolsas de anacardos por \$ 10. Si quisieras comprar 27 bolsas, ¿cuánto costaría?

**Respuestas**

1. **48**
2. **35**
3. **6**
4. **28**
5. **100**
6. **6**
7. **63**
8. **30**